

 Jilemnice a Semily nemocnice s budoucností	MMN a.s. Metyšova 465 514 01 Jilemnice IČO: 05421888 tel.: 481 551 111	04_ONM_SPC_001 Přehled standardně prováděných vyšetření	Strana 1 z 2 Verze: 05, 02/2026
--	---	---	--

PŘEHLED STANDARDNĚ PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ENDOKRINOLOGIE

Scintigrafie štítné žlázy

Vyšetření slouží k posouzení vzhledu, velikosti, uložení a funkční aktivity štítnice, k průkazu případného narušení její tkáně chorobným procesem.

Scintigrafie příštítných tělísek

Výkon se využívá k průkazu hyperplázie či adenomu příštítného tělíska. Významnou roli hraje při určení ektopické lokalizace tělíska.

PNEUMOLOGIE

Perfuzní scintigrafie plic s výpočtem relativní funkce & Ventilační scintigrafie plic aerosolová s výpočtem relativní funkce; event. perfuzní SPECT/low dose CT plic

Obě vyšetření slouží k posouzení funkčního stavu plicní tkáně z hlediska jejího provzdušnění (ventilace) a prokrvení (perfuze), k průkazu případného postižení plic chorobným procesem a k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé plíce na celkové funkci. Nejčastější indikací je odhalení či vyloučení plicní embolie. Vyšetření lze požadovat **statim**.

ŽILNÍ SYSTÉM

Radioizotopová flebografie žilních systémů

- především dolních končetin a pánevních žil & event. horních končetin

Vyšetření slouží ke zobrazení průtoku krve žilním systémem dolní (horní) končetiny, k průkazu žilního uzávěru či jiného chorobného stavu. Vyšetření lze požadovat **statim**.

KARDIOLOGIE

Perfuzní gateovaná tomografie srdečního svalu

- po zátěži a v klidu

Výkon umožní přesně posoudit stav prokrvení svaloviny levé srdeční komory a její výkonnost v zátěžových a klidových podmínkách. Vyšetření v klidu lze požadovat **statim**.

DPD scan

Vyšetření slouží k diagnostice srdeční Transthyretinové amyloidózy.

NEUROLOGIE

Perfuzní scintigrafie mozku

Vyšetření mapuje prokrvení a funkční stav mozkové tkáně. Je neinvazivní alternativou angiografické diagnostiky mozkové smrti.

Scintigrafie dopaminových transportérů ve striatu

Vyšetření se používá při diferenciální diagnostice poruch hybnosti.

Informujte nás prosím při objednávání o případné alergii na Jodovou kontrastní látku!

GASTROENTEROLOGIE

Dynamická scintigrafie motility jícnu a průkaz gastroezofageálního refluxu

Vyšetření se používá k odhalení polykacích poruch, k průkazu případného refluxu (zpětného průniku) žaludečního obsahu do jícnu.

	MMN a.s. Metyšova 465 514 01 Jilemnice IČO: 05421888 tel.: 481 551 111	04_ONM_SPC_001 Přehled standardně prováděných vyšetření	Strana 2 z 2
			Verze: 05, 02/2026

Scintigrafie evakuace žaludku

Výkon přináší informaci o rychlosti vyprazdňování žaludku.

Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest

Vyšetření slouží k posouzení vzhledu, velikosti a funkční zdatnosti jater, k zobrazení odtoku žluči žlučovými cestami do střeva a ke zhodnocení funkce žlučníku.

Dynamická a statická scintigrafie slinných žláz příušních a podčelistních

Výkon se využívá k orientačnímu posouzení morfologie a funkčního stavu slinných žláz a k odhalení případné blokády odtoku slin.

OSTEOLOGIE

Scintigrafie skeletu, třífázová scintigrafie skeletu, SPECT/low dose CT

Vyšetření slouží k odhalení řady chorobných stavů nosného aparátu spojených se změnou intenzitou kostního metabolismu. V řadě případů umožňuje detekci časného stadia onemocnění a přehledně zobrazí celý kosterní systém.

NEFROLOGIE

Dynamická scintigrafie ledvin s výpočtem GF event. ERPF

Vyšetření se užívá k posouzení vzhledu, velikosti, uložení i funkční zdatnosti ledvin, k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé ledviny na celkové funkci a ke zhodnocení odtoku moči z ledvin.

- **furosemidový test** slouží k diferenciální diagnostice odtokových poruch
- **kaptoprilový test** využívá se k průkazu renovaskulární hypertenze

Statická scintigrafie ledvin s výpočtem relativní funkce

Výkon slouží k posouzení vzhledu a uložení ledvin, k průkazu narušení jejich tkáně chorobným procesem a k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé ledviny na celkové funkci.

Radionuklidová cystografie nepřímá s vyšetřením VU refluxu

Nepřímá uroflowmetrie (zhodnocení vyprazdňování močového měchýře) a stanovení měchýřového rezidua

SCINTIGRAFIE LYMFATIK, NÁDORŮ A ZÁNĚTŮ

Nepřímá radionuklidová lymfografie

- **DKK + uzlin pánevních a HKK + uzlin axilárních**

Vyšetření dává informaci o lymfatické drenáži končetin, indikuje se hlavně v diferenciální diagnostice otoků.

Zobrazení sentinelové uzliny před radionavigovaným chirurgickým výkonem při ca prsu a u maligního melanomu

Vyšetření slouží k detekci sentinelových uzlin a zobrazení přívodného lymfatického řečiště.

Celotělová distribuce ⁶⁷Ga citrátu

Vyšetření se využívá k odhalení různých chorobných procesů onkologických či zánětlivých.

Vyšetření celotělové distribuce ^{99m}Tc MIBI

Výkon se užívá v některých onkologických indikacích především v diagnostice plasmocytomu.

Scintigrafie somatostatinových receptorů

Vyšetření slouží k zobrazení tkání s expresí somatostatinových receptorů, především tumorů neuroendokrinního původu, méně často jiných tumorů (např. meningiom).