

VMŠETŘENÍ LYMFATICKÉHO SYSTÉMU PRSU-VYHLEDÁNÍ SPÁDOVÉ UZLINY ČI UZLIN

- slouží k vyhledání prvních spádových uzlin, přes které se filtruje tkáňový mok – lymfa, odtékající z prsu. Touto cestou se šíří i nádorové buňky. Při následné operaci budou tyto uzliny vyjmuty a mikroskopicky vyšetřeny.

Příprava

- můžete jíst, pít, užít léky
- dostavte se v požadovaný čas na naše oddělení (doprovod malými dětmi a těhotnými ženami je nevhodný)
- s sebou si přineste žádanku od lékaře, který vyšetření požaduje, a štítky s osobními daty, které Vám poskytne recepce naší nemocnice
- **ženy informujte nás o případném těhotenství či kojení!**

Průběh vyšetření

- během výkonu budete v průběhu dvou hodin opakovaně klidně ležet na zádech na vyšetřovací lůžku snímacího přístroje (scintigrafické kamery)
- vyšetřovací látku vstříkujeme jednorázově tenkou jehlou pod kůži prsu
- v daných časových intervalech sledujeme její šíření tkáněmi do okolí prsu a podpaží a zobrazujeme lymfatické uzliny, ve kterých se hromadí
- látka **nevyvolává alergické ani jiné nepříjemné tělesné reakce**
- její podání je spojené s rizikem ozáření ionizujícím zářením v malé dávce (podobně jako při rentgenových vyšetřeních)
- toto záření využije i Váš operatér během operace k vyhledání spádových uzlin pomocí detekčního přístroje

Jak se chovat po vyšetření

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. V den vyšetření je však vhodné omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami jen na nezbytnou dobu. (Radioaktivita se z těla zcela vyloučí nejpozději do tří dnů od podání vyšetřovací látky.)

Vyhodnocení

Náš lékař vyhodnotí získaná data pomocí speciálních počítačových programů a zpracuje nález, který ihned odešleme pracovišti, které Vás k výkonu objednalo.

Poznámky

Na oddělení provádíme urgentní (statimové) výkony. Tito pacienti často s akutním ohrožením zdraví se vyšetřují ihned, přednostně a díky tomu se mohou prodloužit čekací doby ostatních vyšetřovaných. V těchto případech Vám děkujeme za toleranci a trpělivost.