

VOŠETŘENÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (STATICKÁ SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)

- slouží k posouzení vzhledu, velikosti, uložení a funkčního stavu štítnice, k průkazu narušení její tkáně chorobným procesem

Příprava na vyšetření

- můžete jíst i pít
- vysazují se léky, které ovlivňují činnost štítné žlázy (obsahují jód či hormony štítné žlázy), určí to lékař, který Vás k vyšetření odesílá (indikující lékař)
- na oddělení se dostavte včas (doprovod malými dětmi a těhotnými ženami není vhodný)
- s sebou si přineste žádanku od indikujícího lékaře a štítky s osobními údaji, které Vám poskytně recepce naší nemocnice
- **ženy informujte nás o případném těhotenství či kojení!**

Průběh vyšetření

- injekčně do žíly Vám podáme vyšetřovací látku
- tato látka nevyvolává alergické ani jiné nepříjemné tělesné reakce
- její podání je spojené s ozářením ionizujícím zářením v malé dávce (podobně jako při rentgenových vyšetřeních)
- látka se během 15 až 30 minut nahromadí ve štítnici
- následuje vlastní výkon, při kterém budete klidně ležet na zádech s podloženou horní částí hrudníku a mírně zakloněnou hlavou
- detektor přístroje snímá oblast krku a 5 až 15 minut vytváří obraz štítné žlázy

Jak se chovat po vyšetření

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření, a to ani ve styku s jinými osobami. V den vyšetření je však vhodné omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami na nezbytnou dobu. (Radioaktivita se z těla zcela vyloučí nejpozději do tří dnů od podání vyšetřovací látky.)

Vyhodnocení

Náš lékař vyhodnotí získaná data pomocí speciálních počítačových programů a zpracuje nález, který většinou během dvou následujících pracovních dnů odesíláme lékaři, který Vás k výkonu objednal.

Poznámky

Na oddělení provádíme **urgentní** (statimové) výkony. Tito pacienti často v akutním ohrožení zdraví se vyšetřují ihned, přednostně a díky tomu se mohou prodloužit čekací doby ostatních vyšetřovaných. V těchto případech Vám děkujeme za toleranci a trpělivost.