

INFORMACE PRO PACIENTY/ZDRAVOTNÍKY	Příprava pacienta k RDG vyšetření
---	--

1. skiografie – prosté snímky, mammografie – bez přípravy

2. sonografie (ultrazvuk)

- vyšetření měkkých tkání, cév, štítné žlázy, prsů, kloubů - bez přípravy
- vyšetření břicha – v den vyšetření nalačno, 2 dny před vyšetřením nenadýmavá strava (NE luštěniny, perlivé nápoje, čerstvé pečivo, příliš syrové zeleniny a ovoce)
- vyšetření močového měchýře – vypít alespoň 1l tekutin, do vyšetření nemočit

3. CT vyšetření

- vyšetření páteře, kostí, kloubů, dutin – bez přípravy
- vyšetření mozku, hrudníku, břicha, pánve, cév s intravenózní aplikací kontrastní látky – nalačno, tj. nejméně 6 hod. před vyšetřením nejíst, možno pít neperlivé čiré tekutiny (voda, čaj)
- u vyšetření břicha a pánve je často žádoucí vypít větší množství neperlivé vody k naplnění střevního traktu – pacient dostane instrukce při objednání nebo dostane napít po příchodu na oddělení

4. skiaskopie

- vyšetření jícnu a žaludku – nejíst, nepít, nežvýkat
- vyšetření tlustého střeva (irrigografie) – preparát na vyčištění střeva (Moviprep, Clensia) zajišťuje indikující lékař

5. vylučovací urografie (IVU)

- 2 dny před vyšetřením nenadýmavá strava, dostatečně pít
- v den vyšetření nalačno

OBECNĚ při každém intravenózním podání kontrastní látky (CT, IVU) nutno řešit

1. závažnou alergii – protialergická příprava: 40 mg Prednison p.o. 12 hod. a 20mg 6 hod. před vyšetřením

2. funkci ledvin – vyšetření aktuální hodnoty sérového kreatininu (ne starší 2 týdny)
- hraniční hodnota pro podání kontrastní látky je 130 $\mu\text{mol/l}$

3. rizikového pacienta – věk nad 70 let, cukrovka, porucha funkce ledvin – nezbytná dostatečná hydratace před vyšetřením, příp. renoprotektivní příprava:
2 dny před, v den vyšetření a 2 dny po: Preductal 3x1tbl., ACC long 2x1tbl.,
+ v den vyšetření vysadit ACI, PAD, diuretika

Podrobnější informace viz Metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních látek.